

Physische und psychische Veränderungen in Abhängigkeit des Blutalkoholspiegels

0,3 ‰	leichte Verlängerung der Reaktionsgeschwindigkeit auf akustische oder optische Reize, Augenzittern, Schriftveränderungen, leichte Gangstörungen, Verlängerung der Dunkelanpassung beim Fahren
0,5 ‰ bis 0,6 ‰	Blindzielbewegungen sind gestört, Konzentrationsstörungen, Herabsetzung der Sehleistung für die Ferne, Störung anderer Seh-/Wahrnehmungsfunktionen
0,5 ‰ bis 1,5 ‰	leichte Trunkenheit, Euphorie, Kritikschwäche, Antriebssteigerung, Rededrang
0,8 ‰	deutliche Einschränkung der Konzentration, weitere Seh- und Wahrnehmungseinbußen, deutliche Verlängerung der Reaktionszeit auf optische Reize
1,0 ‰	Gangabweichungen, weiteres Absinken der Konzentration und Aufmerksamkeit, deutliche Seh- und Wahrnehmungsstörungen, Sprachverständnisstörungen
1,5 ‰ bis 2,5 ‰	mittlerer Rausch, zunehmendes Geltungsbedürfnis, Distanzlosigkeit, Uneinsichtigkeit, Sprachstörung wie Silbenstolpern oder Silbensmieren, ungezügelte Reaktionen
2,5 ‰ bis 3,5 ‰	schwerer Rausch, starke Geh- und Sprechstörungen (Torkeln, Lallen), Orientierungsstörung, Einschlafen, Bewusstlosigkeit
mehr als 3,5 ‰	schwerste Trunkenheit, unmittelbare Lebensgefahr, Reflexe ausgefallen, alkoholische Narkose, Gefahr von Atemlähmung
4 ‰	in der Regel tödliche Blutalkoholkonzentration, kann aber bei chronischem Alkoholkonsum auch deutlich höher liegen
